

Захист лісу від шкідників та хвороб


Кліматичні та фізико-географічні умови України є сприятливими для масового розмноження шкідників і хвороб лісу.

Сукупність сприятливих для розповсюдження шкідників і хвороб лісу природних факторів в останні роки зумовила значне поширення їх осередків на площу біля 600 тис. га.



Роботи із захисту лісу в Україні здійснює спеціалізована служба Держлісагентства. До завдань зазначеної служби входять нагляд, облік шкідників і хвороб лісу, проведення лісопатологічних обстежень, призначення та проведення лісозахисних заходів, методична допомога працівникам лісової охорони на місцях. Завдяки ефективно проведеним у 2011 році заходам боротьби зі шкідниками, у 2012-2014 роках ситуація значно покращилась і зовсім не відмічалось спалахів чисельності звичайного соснового пильщика.

Обсяги проведення винищувальних заходів боротьби проти найнебезпечніших шкідників лісу
у 2007 - 2014 роках



Найбільш поширеними в лісах Держлісагентства є звичайний та рудий соснові пильщики, сосновий шовкопряд, непарний шовкопряд, зелена дубова та інші листовійки, п'ядуни. Хвороби у лісових насадженнях, що потребували лісгосподарського втручання, розповсюджені на площі більше 300 тис. га, з них найбільш поширена коренева губка сосни та ялини – більше 120 тис. га.

На сьогодні лісопатологічна ситуація в лісах України продовжує бути напруженою, особливо у центральних, південних та східних областях, і вимагає у поточному році постійної уваги та оперативних дій щодо недопущення масового ураження насаджень шкідниками і хворобами лісу.

Біологічні препарати для обробки лісових насаджень (Вірін-ЗСП, Вірін-Діпріон та Вірін-НШ) виробляються біологічною лабораторією державного спеціалізованого лісозахисного підприємства „Харківлісозахист”.

Для Карпатського регіону значною проблемою залишається прогресуючий процес всихання як похідних, тобто таких, що ростуть у невідповідних лісорослинних умовах, так і корінних ялинників. Це негативне явище охопило більше 36 тис. га. Першопричиною всихання ялинників є коренева губка, опеньок, довготривалі посухи та пониження рівня ґрунтових вод. Під дією коренових гнилей погіршується санітарний стан деревостанів, зростає кількість вітровальних дерев, посилюється процес заселення насаджень стовбуровими шкідниками – переважно короїдами.

Всихання ялинників в Карпатах фахівцями і науковцями розглядається як стихійне лихо, причиною якого є зниження природного імунітету та ослаблення насаджень в результаті глобального потепління клімату і техногенного впливу. Всихання ялинників спостерігається не лише в Україні, а і в усій Центральній Європі.